

## 1月龄的正常体检筛查问卷

## 基于美国儿科学会和中国儿童预防保健的指南撰写,将指南融合为表格 父母填表/医生补充 口答案是兰色字体父母在家中纠正 口答案是红色字体应求医

<b>姓名</b> : <b>性别</b> : 男	女 <b>出生</b>	年月	]日	年龄 _	天龄	
生长喂养和排便 生长曲线(护士或医生帮助填写):	□出生孕		出生体重	页上划"√", ——	,可以多选)	
体重:上次天龄 gth; 目前 :		母亲孕期用药,			<b>.</b>	**
身长: 上次		母亲孕期饮酒和 先天性感染: 约				]等
	□ホ□■					核黄疸等、请注明:
头围: 上次天龄cmth; 目前c						惊厥、脑血管疾病
<b>人乳喂养</b> 每侧乳房分钟 平均间隔时间_		营养不良、甲科				
吸奶器吸人乳喂养每次毫升 平均间隔时间_		兄弟姐妹患 ASI				
<b>配方喂养:</b> 每次毫升 平均间隔时间_		遗传性疾病: 刻		₽基因和多基	<b>ച</b> 遗传病、线粒	体病等。
□是□否 补充维生素AD(人乳喂养或配方喂养〈800) □否□是 喂水(不建议)		出生缺陷,畸形 <b>/高风险筛查</b>	5			
□否□是 补铁(早产儿或有缺铁高危因素儿补铁)	□是□否	<b>听力筛查通过</b>				
□否□是 其他保健品/营养素,请注明:	□是□否	遗传代谢病筛查	查已做(甲减,泵	苯丙酮尿症, 先	天性肾上腺皮	质增生症, G6PD)
□否□是 补铁(早产儿或有缺铁高危因素儿补铁) □否□是 其他保健品/营养素,请注明: □否□是 喂养问题(难喂养,呕吐,溢奶等)请注	明: □否□是	疑诊发育性髋	关节发育不良	□风险:家族	史,妊娠晚期	3 个月臀位
<b>换湿尿布</b> 次/天(6-8次/d)	□无□有					乍和爱好涉及铅暴露
<b>大便</b> 次/天 □ <mark>水便</mark> □稀糊便 □软便 □	4田1田					, 行为情感等问题
睡眠行为和情感	□省□走	家族出生缺陷, 家族婴儿猝死。		趣(ペ	细胞溜, 先大性	白内障史等疾病)
<del>陸戦17月441月88</del> 晩上每隔小时醒 白天每隔小时醒 总睡眠		家族委儿猝死。 家人有肝炎,或		生核病检测导原	71. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 1	1
□是□否 与父母分开在婴儿床上仰面躺着睡防窒息			X-7=11/X/M/-X=	HIXWITTWIE	在江台 田 初19年	4
□是□否 每次喂养后改变头的位置以防头变扁平	1月酸止	常发育评估				
□否□是 睡眠问题,请注明	人区列	俯卧时可短暂抬	·	nil		
□否□是 哭闹难以安慰,过度依恋,行为情感问题	1是/王阳	四肢运动对称协			和服	
活动学习激发潜能(2-3小时/天, 高危儿4-5小时/天)			4-5) 10 ·· 1 ·· 37/3/1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	
□是□否 家人每天面对面, 眼对眼, 边说边玩高效互	动    □是□否	静息时可略微张	开手指			
□是□否 父母家人陪伴玩耍时间		抓握爸妈手指				
	}钟 / 天 <b>语言(理</b> 角		** * * * * /64	_		
		对声音有反应, 发出简短的元音		·声		
		发面间短的儿童 <b>认知与自理</b>	<b>国</b> 拉百			
		识别父母的声音	音, 听父母声音	·会平静下来或	转动	
口腔健康筛査		醒时注视父母的				
□是□否 父母或照料者定期检查牙和洗牙 □否□是 父母或照料者有蛀齿,用嘴含安抚奶嘴/如	4  安	对周围环境有原		短地看物体		
□否□是 实实然将有特定员,加强自实现别需/为□否□是 宝宝平躺照料者把奶瓶奶嘴放到宝宝嘴里	□走□省	睡眠时自然微乳				
	□走□省	饥饿/疲倦的哭	声有个同			
<b>健康筛查预防接种</b> □是 <mark>□否</mark> 已按计划接种乙肝疫苗及卡介苗		开始自我安慰 通过哭泣和面语	収表情 身休を	动作等行为表	<b>法</b> 不适	
□否□是 曾对免疫针有反应, 对接种免疫针有担忧.		烦躁时被抱起或				
□是□否 已按计划接种乙肝疫苗及卡介苗 □否□是 曾对免疫针有反应,对接种免疫针有担忧 □否□是 近来是否有生病,求医,急诊,急救,专□是□否 家中未免疫照料者和儿童接种百日咳疫苗	 科诊治 <b>发育迟缓</b>		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
□是□否 家中未免疫照料者和儿童接种百日咳疫苗	和流感疫苗 🔲 醒时	不注视父母的脸,	无眼神接触			
□是 <mark>□否</mark> 知道什么时间找医生,怎么为宝宝测体温		声, 不发出声音				
父母家庭		无力, 全身瘫软	不能短暂抬头	:		
□否□是 家庭生活居住/粮食/经济困难		运动不协调 亮的声音无反应				
□是□否 家庭良好关系,家庭幸福感,父母健康		光无眨眼反应				
□是□否 妈妈照顾婴儿愉快,得到足够休息						
□是□否 爸爸和家人帮助照料. 妈妈有时间与家人享□否□是 有家庭争吵或不协调,家庭变动		在婴儿床上睡觉	는 무상무리	5.安不同庄		
□百 <mark>□定</mark> 有豕庭于炒浆个奶妈,豕庭支切		平躺照料者把				
爱丁堡 EPDS 妈妈产后抑郁筛查量表*(医生基于 EPDS	* +n zz::::::/+-\	乘汽车总是使用			座中位面向后	□未乘汽车
过去7天里妈妈的感受	□是□否	家中水龙头水油	过热 (最热水)	昷应<120°F/48	8.8°C)	
□常常 □减少 <mark>□明显减少 □不能</mark> 看到事物有趣面	, 110,74,62,14	换尿布时一直=		客		
□常常 □減少 □明显減少 □不能 期待着享受生活		洗澡时从不离。				
□没有□不经常□常常□总是事情出错时,不必□恐有□不经常□常常□总是事情出错时,不必□恐有		给颈挂玩具奶啊 身边有人抽烟!				
□没有 □不经常 □常常 □总是 无缘无故感到焦虑□没有 □不经常 □常常 □总是 无缘无故感到害怕	2/16/20	抱着婴儿喝或		夜体		
□没有 □不经常 □常常 □总是 无缘无政感到香门□没有 □不经常 □常常 □总是 很多事冲着我来,		家里有紧急电话			<b></b> 救护理	
□没有 □不经常 □常常 □总是 很不开心,以致难	~~~~ · ~	家中有火警和-				
□没有 □不经常 □常常 □总是 感到难过和悲伤	此筛查问	卷				
□没有 □不经常 □常常 □总是 很不开心一直在哭		<b>™</b> 品,在美国儿童	医院诊所应用	; 2016年2月	月3日全面修改	[
□没有 □不经常 □常常 □总是 想到要伤害自己		0.日修改 译由文				

\*Cox. J.L. Holden. J. M. and Sagovsky. R. 1987 Detection of postnatal